



Strophurus intermedius: scheda di allevamento

Ordine: Squamata
Sottordine: Sauria (Lacertilia)
Infraordine: Gekkota
Famiglia: Gekkonidae
Sottofamiglia: Diplodactylinae

Descrizione

E' un piccolo gecko notturno del sud-ovest australiano che misura circa 10/12 cm coda compresa. Questo gecko è definito arboricolo nonostante la sua scarsa capacità di arrampicamento infatti, ama vivere a contatto col substrato o appeso a dei rametti a qualche cm da terra. In Cattività sono disponibili 2 locality: western e southern form.

Alloggiamento

Questi piccoli gechi vanno alloggiati singolarmente o a coppie in terrari di 30x30x30 con sabbia, qualche tana sul fondo e dei rametti dove il gecko si posizionerà durante la caccia notturna.

Temperatura

Il range di temperature da mantenere nel terrario è 30/32°C di giorno e 24/25°C durante la notte.

Umidità

Il tasso di umidità relativa per questa specie, come per tutti i deserticoli, deve essere attorno al 30%. Mai fare mancare però una tana umida per poter facilitare le operazioni di muta e deposizione delle uova.

Alimentazione

Blatte, grilli e tarme della farina delle opportune dimensioni compongono la dieta principale. E' necessario integrare la dieta con Ca+D3 almeno 4 volte a settimana (particolare attenzione va data alle femmine durante il periodo riproduttivo).

Riproduzione

Il periodo riproduttivo di questa specie inizia ai primi di marzo per concludersi a fine settembre. Durante questi mesi le femmine depongono 2 uova alla volta, a distanza di 30/40 giorni dopo l'accoppiamento.

Il periodo di brumazione è consigliato dai primi di novembre a fine gennaio.

Le uova appena deposte andranno incubate a diretto contatto con perlite o vermiculite inumidita (rapp: 1:1) tra i 25/29°C.

I piccoli appena nati saranno lunghi circa 1 cm e andranno stabulati come gli adulti, anche se mangeranno solo moscerini della frutta (*Drosophila* sp.) o grilli microscopici.

